

INCLISIRAN

PERCORSO PILOTA MULTIDISCIPLINARE DI INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO

Castagna T. (1) - Esposito A. (1) - Sironi M. (1) - Spoladore R. (2) - Ferradini R. (3) - La Torre G. (1)

(1) SC Farmacia, ASST Lecco, (2) SC Cardiologia, ASST Lecco, (3) IFeC, ASST Lecco.

BACKGROUND

Numerose evidenze scientifiche dimostrano l'esistenza di una relazione lineare tra ipercolesterolemia, incidenza di malattie cardiovascolari e mortalità correlata. L'insufficiente controllo dei livelli di LDL-C dipende dalla mancata aderenza/persistenza alla terapia, anche nelle seconde e terze linee di trattamento.

OBIETTIVI

Inclisiran è un farmaco con un approccio innovativo basato sul silenziamento genico e, oltre a superare alcuni limiti delle terapie tradizionali (come ad esempio gravi effetti collaterali in caso di alti dosaggi o immunogenicità e comparsa di resistenza), ha il vantaggio di essere somministrato, dopo la dose di carico, ogni 6 mesi. [1] [2] [3]

Pur essendo farmaco di fascia A-PHT la scheda tecnica ne impone la somministrazione da parte di un operatore sanitario.

MATERIALI E METODI

Nel rispetto delle indicazioni autorizzate e rimborsate e del percorso multidisciplinare aziendale, i centri prescrittori abilitati, compilate la scheda di monitoraggio AIFA e la prescrizione File F, inviano la documentazione alla Farmacia che provvede all'approvvigionamento del farmaco, predispone per ogni singolo paziente individuato un confezionamento "nominale", contatta le Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), responsabili del trasporto e della somministrazione. Le IFeC provvedono alla convocazione del paziente presso la Casa di Comunità individuata, presidi a rilevanza distrettuale che erogano servizi sanitari e sociosanitari non emergenziali, distribuiti capillarmente sul territorio e in cui operano equipe multidisciplinari integrate afferenti al Dipartimento aziendale della Fragilità [4]

L'IFeC, concordando con il paziente la Casa di Comunità, le date e gli orari di somministrazione secondo un planning condiviso a livello multidisciplinare, procede alla identificazione del paziente, al controllo della prescrizione, alla somministrazione, alla registrazione della stessa sul diario infermieristico nonché all'invio della ricevuta di somministrazione firmata con flag di avvenuta somministrazione per la ricetta File F sia al prescrittore, per l'eventuale successiva rivalutazione, che alla Farmacia per la dispensazione sul registro AIFA e il controllo finale del percorso. L'IFeC programma gli appuntamenti successivi, monitora proattivamente il rispetto delle scadenze nello schema di trattamento e si relaziona con prescrittore e farmacista per informarli dell'aderenza al piano terapeutico e per consentire così una corretta programmazione di acquisto.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Raal FJ; Inclisiran for the Treatment of Heterozygous Familial Hypercholesterolemia (ORION-9) NEJM 2020
- [2] Ray KK; ORION-10 & 11, NEJM 2020
- [3] Mach; 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias, EHJ 2020
- [4] G1.2022.0040052 05/10/2022 e G1.2022.0041627 14/10/2022 Regione Lombardia
- [5] Di Fusco SA; Position paper ANMCO: Inclisiran: un approccio terapeutico innovativo per la gestione dell'ipercolesterolemia, G Ital Card 2023

RISULTATI ATTESI E CONCLUSIONI

Tale percorso di presa in carico, razionalmente articolato tra ospedale e territorio come da Decreto Ministeriale 77/2022 [4] potrebbe favorire una migliore compliance al trattamento grazie alla prossimità delle cure, alla facilità di accesso alle stesse e alla percezione di continuità assistenziale. L'incrementale territorializzazione dell'assistenza, la possibile riduzione di ricoveri ordinari grazie all'ottimizzazione della cura, il miglior target di risposta con riduzione di eventi avversi potrebbero consentire, inoltre, un contenimento dei costi diretti e indiretti, sanitari e non. Infine, sarebbe garantita l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa con un percorso multidisciplinare favorevole alla territorializzazione della cura di una terapia outpatient [5]. Il progetto, così strutturato, potrebbe rappresentare, infine, un modello di riferimento per avviare la somministrazione di altri farmaci non altrimenti erogabili in setting di pazienti ambulatoriali (si pensi, ad esempio, alla somministrazione endovenosa di ferrocarrbossimaltosio nei pazienti con insufficienza cardiaca).