

Antipsicotici long acting: analisi della distribuzione e della continuità terapeutica –Asl Roma 3

Obiettivo

Analizzare il consumo di farmaci antipsicotici long-acting (dispensazione diretta da SPDC Asl Roma3 2021) al fine di valutare la distribuzione e la continuità dei trattamenti al fine di una più consapevole presa in carico del paziente

Introduzione


I farmaci antipsicotici (NO5A) sono fondamentali nel trattamento della schizofrenia e l'assunzione di una terapia continua è importante ai fini del controllo dei sintomi e delle ricadute. Purtroppo le percentuali di non aderenza al trattamento variano tra il 40 e il 90%. Le formulazioni LAI dei nuovi antipsicotici rappresentano un'ulteriore espansione dell'armamentario terapeutico della schizofrenia, con rilevanti possibili implicazioni riguardanti il trattamento continuativo della schizofrenia e della non aderenza. L'aumento del costo medio per farmaci antipsicotici è ampiamente bilanciato dalla riduzione del costo delle prestazioni erogate dal dipartimento di salute mentale

Metodi


L'analisi è stata condotta utilizzando i flussi della Distribuzione Diretta della Asl Roma3 registrati nel 2017 e nel 2021 con il sistema Areas. E' stata studiata la distribuzione (per aripiprazolo -poiché risultato il più utilizzato- anche la continuità del trattamento) individuando i pazienti continuativi (80% del trattamento previsto). Definita la corte di pazienti con prescrizioni di farmaci antipsicotici LAI nell'ultimo trimestre del 2020, questi sono stati seguiti per tutto il 2021

Risultati

I pazienti trattati con farmaci antipsicotici LAI nel 2021 sono 624, di questi il 48% F e il 52% M.



L'età dei pazienti trattati è suddivisa come segue: 15-24 8%, 25-64 85%, ≥65 7%. Per quanto concerne la suddivisione dei trattamenti tra i vari p.a.: Paliperidone 3 monthly 6%, Paliperidone 28%, Risperidone 30%, Aripiprazolo 36%.



L'analisi della continuità terapeutica evidenzia una percentuale pari al 56% (nel 2017 78,1%).

Conclusioni

Tra i farmaci antipsicotici LAI il p.a. più prescritto risulta essere Aripiprazolo. Il dato della continuità terapeutica è in calo, dato probabilmente da imputare alle difficoltà di accesso ai servizi a causa della pandemia. L'adozione di un PDTA potrebbe rappresentare un utile strumento di sorveglianza clinica. In questo contesto sarebbe auspicabile maggior coinvolgimento del farmacista ospedaliero e territoriale ed un maggiore dialogo tra reparti di psichiatria e farmacia

Contatti

P.Cargnino (1) M.Mottola (1) F.Dolzi (1) A.Biondi (1) R.Di Turi (2)

(1) UOC Farmacia Ospedaliera G.B Grassi Ostia-Roma

(2) Direttore Dipartimento dei Servizi G.B Grassi Ostia-Roma