


MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI DI CLOZAPINA IN UNA ASL DELLA SARDEGNA

Usai M. (1), Pes I. (2), Muzzoni M. (3), Becciu A.M.F. (2)

- 1) Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera Università degli Studi di Sassari,
- 2) Servizio Farmaceutico Territoriale ASL Sassari
- 3) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

OBIETTIVO

Verificare che nelle ricette di Clozapina spedite nel periodo Luglio-Dicembre 2021 dalle farmacie di una ASL della Sardegna sia indicata la regolare conta leucocitaria del paziente.



INTRODUZIONE

La Clozapina è un farmaco indicato come seconda linea di trattamento in caso di resistenza o intolleranza agli altri farmaci antipsicotici sia in pazienti schizofrenici che in pazienti con disturbi psicotici da morbo di Parkinson.

L'agranulocitosi è uno tra i più gravi effetti collaterali che questo farmaco può provocare e per questo, al momento della prescrizione su ricetta del sistema sanitario nazionale, è richiesto al medico di certificare che il paziente presenti una conta leucocitaria nella norma.




METODI

Dal database regionale per la rilevazione dei dati di prescrizione della farmaceutica convenzionata sono state estrapolate tutte le ricette di Clozapina spedite in regime SSN nel periodo indicato e sono state isolate quelle con conta leucocitaria mancante.

RISULTATI

Da Luglio a Dicembre 2021 sono state spedite 986 ricette di clozapina per un totale di 1712 confezioni prescritte.

Dalle quali si è rilevato che :



DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La percentuale di ricette di Clozapina mancanti di conta leucocitaria emersa dall'analisi è elevata considerando che l'obbligo di tale formalismo è largamente conosciuto tra i farmacisti e che la sanzione prevista dalla regione Sardegna per tale irregolarità è l'addebito alla farmacia del costo del farmaco e del servizio di distribuzione per conto. Per migliorare l'appropriatezza prescrittiva e garantire al paziente l'assunzione in sicurezza del medicinale sarà necessario che il servizio farmaceutico della ASL coinvolta metta in atto delle attività di sensibilizzazione ed informazione sull'argomento focalizzandosi in particolare sui due medici di base e le tre farmacie a cui è riconducibile il maggior numero delle irregolarità riscontrate.