

REAL WORLD EVIDENCE SULL'IMPIEGO DEI FARMACI DELL'EMICRANIA IN DUE AZIENDE SANITARIE NELLA REGIONE VENETO

Chinellato G. (1), Andretta M. (2), Degli Esposti L. (3)
(1) Azienda Ospedaliera Padova, (2) Ulss8, (3) Clicon

Obiettivi

Analizzare una popolazione di pazienti affetta da emicrania e valutarne le caratteristiche epidemiologiche, la prevalenza di uso dei farmaci maggiormente utilizzati e l'impatto economico sul SSN.



Introduzione

L'emicrania è una patologia molto comune e fortemente invalidante, secondo l'OMS, come la settima malattia più diffusa al mondo e la seconda causa più frequente di disabilità in termini di anni vissuti con disabilità. Fino ad ora però le terapie sono state limitate alla cura dei soli sintomi ma recentemente, le agenzie regolatorie del farmaco (EMA ed AIFA) hanno autorizzato gli anticorpi monoclonali anti-CGRP come farmaci per la cura della patologia. Visto l'elevato costo di questi farmaci, è importante identificare correttamente i pazienti da sottoporre al trattamento.

Materiali e metodi


Sono stati analizzati retrospettivamente i flussi amministrativi della farmacia territoriale, pronto soccorso, scheda di dimissione ospedaliera, specialistica ambulatoriale e farmaci ad erogazione diretta delle ULSS 3 Serenissima e ULSS 8 Berica negli gli anni 2017-2019. Si è poi effettuata una stima del consumo di risorse sanitarie in termini di farmaci, test diagnostici, visite specialistiche e ospedalizzazioni, facendo una stratificazione in base al tipo di farmaco.

Risultati

Emerge che dei 2.131 pazienti identificati, l'età media è 47,8 anni, il 58,1% non presentano comorbidità e che l'82,1% sono donne.

	Pazienti inclusi 2,131
Età (media ± ds)	47.8 ± 13.8
Sesso maschile	381 (17.9 %)
Sesso femminile	1750 (82.1 %)
CCI	
0	1235 (58.05 %)
1-2	855 (40.1 %)
3-4	38 (1.8 %)
≥ 5	NE


In media i costi annuali di un paziente risultano essere 1.193 € nel periodo di caratterizzazione (anno prima dell'inizio del trattamento profilattico) e 1.378 € nel periodo di osservazione (anno dopo l'inizio del trattamento profilattico).



Verificando attraverso i flussi amministrativi le condizioni di eleggibilità previste dal piano terapeutico ai fini della prescrizione di anticorpi monoclonali anti-CGRP, risulta che i 42 pazienti in trattamento non sembrano possedere i criteri per l'avvio della terapia.

Conclusione e discussione

Dal presente studio emerge una netta prevalenza di esposizione delle donne e l'età media della popolazione affetta da emicrania ricade nei soggetti in età lavorativa in assenza di co-patologie.



Appare inoltre una bassa appropriatezza d'uso per gli anticorpi che sono prescritti a persone che non rispondono ai criteri di eleggibilità indicati nel piano terapeutico.

Prescritto e indicato OK Numero pazienti=0	Prescritto non indicato SOVRA-USO Numero pazienti=42
Non prescritto indicato SOTTO-USO Numero pazienti=0	Non prescritto non indicato OK

Reference

Valentina Perrone, Chiara Veronesi, Elisa Giacomini, Margherita Andretta, Stefania Dell'Orco, Giovambattista De Sarro, Fabio Lena, Anna Michela Menti, Marianonietta Naclerio, Daniela Ritrovato & Luca Degli Esposti (2020) Treatment patterns, health resource consumption, and costs of patients with migraine in an Italian real-world setting, Current Medical Research and Opinion, 36:12, 1991-1998, DOI: 10.1080/03007995.2020.1835850