

# Farmacovigilanza in allattamento: valutazione delle problematiche relative all'allattamento al seno e la contestuale necessità di trattamento con farmaci. L'esperienza del dipartimento materno-infantile dell'AUSL di Bologna


E. Sangiorgi\*, D. Savini\*, F. Quaka°, C. Nobili°, V. Valastro\*

N.39

\* Dipartimento Farmaceutico, Ausl di Bologna, ° FaBiT, Università di Bologna

## Introduzione e scopo:

Il Ministero della Salute è impegnato nella promozione dell'allattamento al seno per i suoi benefici sulla salute materno-infantile, in accordo con le raccomandazioni di Unicef e OMS. Presso la neonatologia, ostetricia e pediatria dell'Ospedale Maggiore è in corso uno studio sull'uso di farmaci in allattamento e sulle eventuali reazioni avverse ai farmaci (ADR), in madri e neonati, al fine di valutare se i farmaci costituiscano causa di interruzione dell'allattamento



## Discussione e conclusioni:

Lo studio intende contribuire alla gestione corretta dei farmaci in allattamento, sulla base di evidenze scientifiche, considerando che la maggior parte dei farmaci non si concentra nel latte materno in livelli clinicamente significativi e l'interruzione terapeutica dovrebbe avvenire solo in caso di rischio per il bambino e la madre. Il 66% delle donne in allattamento si trova ad assumere farmaci, ma spesso lo fa esitando sulla compatibilità della cura con la salute del lattante.

## Materiali e Metodi:

Lo studio, iniziato nel 2018, si articola in diverse fasi:

- ❖ Reclutamento delle madri al parto
- ❖ somministrazione di un questionario su: durata dell'allattamento, comparsa di ADR e farmaci assunti
- ❖ Contatto telefonico delle madri reclutate al 3° e 6° mese per valutare la prosecuzione dell'allattamento
- ❖ Osservazione con monitor-farmacista che rileva i dati tramite utilizzo mirato del questionario durante un accesso per qualunque ragione.

I dati sono inseriti in un database e confrontati con la banca dati Lactmed per le informazioni sulla sicurezza dei farmaci nei lattanti

## Risultati:

Sono state intervistate 506 madri, registrando 2 ADR nei lattanti e 7 nelle mamme. Al 6° mese raramente permaneva l'allattamento esclusivo. Il 6% delle madri fumava. Si registra forte riluttanza per il caffè e predisposizione per le tisane al finocchio. 3 mamme smettevano di allattare per la terapia, 25 sospendevano la terapia per allattare, 35 modificavano la terapia. Farmaci più utilizzati: paracetamolo, ibuprofene, amoxicillina.

